

Bei leicht unterdurchschnittlicher Sonnenscheindauer normal temperiert und zu nass

## Auffallend wechselhaft und gewitterreich

### STATISTIK für JULI 2009:

(\* Mittelwert der Jahre 1980 bis 1999, alle anderen Mittelwerte beziehen sich auf den Zeitraum 1951 bis 1970)

Monatsmittel:	+ 17,89°C	(+ 17,84°C)*
Sommertage:	12	(8,9 Tage)
Hitzetage:	1	(1,1 Tage)
Niederschlag:	143,7 mm	(115,0 mm)* = 125,0 %
Tage mit $\geq 0,1$ mm:	19	(15,6 Tage)
Tage mit $\geq 1,0$ mm:	13	(12,6 Tage)
Tage mit $\geq 10,0$ mm:	4	(4,1 Tage)
Mittlere Luftfeuchte:	78,8 %	(76 %)
Tage mit Nebel:	2	(2,1 Tage)
Tage mit Gewitter:	13	(6,7 Tage)
Mittlere Bedeckung:	58,6 %	(62 %)
Gesamtsonnenscheindauer:	235,3 Stunden	(240,1 Stunden) = 98,0 %
Heitere Tage:	2	(3,3 Tage)
Trübe Tage:	5	(9,8 Tage)

### STATISTISCHE AUFFÄLLIGKEITEN:

- 13 Gewittertage mit mindestens 23 Gewitterzellen (Mittelwert: 6,7 Tage). Seit Beginn der Schussenrieder Wetteraufzeichnungen gab es nur im Juni 2003 (15) sowie im Juli 1997 (14) noch mehr Gewittertage.
- 19 Tage mit  $\geq 0,1$  mm (15,6 Tage)
- 12 Sommertage (8,9 Tage)
- 5 trübe Tage (9,8 Tage)